世界卫生组织

执 行 委 员 会
第一二六届会议
临时议程项目 9.1

EB126/37 Add.1
2009 年 12 月 17 日

# 咨询机构的报告

## 专家委员会和研究小组

### 专家咨询团和专家委员会及其成员

### 秘书处的报告[1]

**建立或解散专家咨询团**

1. 解散了下列专家团：布鲁氏菌病专家咨询团和慢性退化性疾病（风湿病）专家咨询团。建立了药物安全专家咨询团。

**专家咨询团成员**

2. 截至 2009 年 12 月，47 个专家咨询团的成员人数总共为 781 人，2008 年 12 月时为 738 人。所有咨询团成员的区域分布如下：非洲区域 11%，美洲区域 24%，东南亚区域 9%，欧洲区域 32%，东地中海区域 11%，西太平洋区域 13%。所有咨询团成员中 27%是妇女。

3. 本报告附有截至 2009 年 12 月按咨询团、区域和性别排列的所有咨询团的一份清单。如果提出要求，可以进一步提供按区域和国家排列的专家详细名单。

[1] 本报告系根据《专家咨询团及专家委员会条例》第 4.23 条规定向执行委员会提交。

## 专家委员会会议

4. 2009 年召开了下述委员会会议：

卫生研究咨询委员会（第 51 次会议），日内瓦，2009 年 3 月 16-18 日（14 名成员：9 名男性，5 名女性）；（第 52 次会议），巴拿马城，2009 年 11 月 11-14 日（14 名成员：9 名男性，5 名女性）

生物标准化专家委员会（第 60 次会议），日内瓦，2009 年 10 月 19-23 日（10 名成员：7 名男性，3 名女性）

基本药物的选择和使用专家委员会（第 17 次会议），日内瓦，2009 年 3 月 23-27 日（14 名成员：8 名男性，6 名女性）

药物制剂规格专家委员会（第 44 次会议），日内瓦，2009 年 10 月 12-16 日（10 名世卫组织成员：7 名男性，3 名女性）

粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会（第 71 次会议），日内瓦，2009 年 6 月 16-24 日（6 名世卫组织成员：4 名男性，2 名女性）；

5. 向六个专家咨询团中来自 30 个国家的 68 名咨询团成员发出了参加这些会议的邀请，11 名成员未能参加。

附件

## 按咨询团和区域排列的专家咨询团成员组成情况

| 世卫组织专家咨询团 | 非洲 | | 美洲 | | 东南亚 | | 欧洲 | | 东地中海 | | 西太平洋 | | 总计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | W | N | W | N | W | N | W | N | W | N | W | N | W | % |
| 急性细菌性疾病 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 老龄化与健康 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36 |
| 生物标准化 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3 | 14 |
| 输血医学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 9 | 38 |
| 癌症 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 |
| 心血管病 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 慢性退化性疾病（糖尿病） | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 9 |
| 临床行为准则以及临床研究方法和伦理 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 10 | 48 |
| 临床外科程序 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 药物依赖（依赖倾向评价） | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | 4 | 25 |
| 药物依赖和酒精问题 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 26 | 6 | 23 |
| 药物评价 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 50 | 23 | 46 |
| 药物政策和管理 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | 12 | 46 |
| 食品安全 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 7 | 24 |
| 卫生实验室服务 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 31 |
| 健康促进 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 29 | 16 | 55 |
| 卫生科学和技术政策 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 10 | 42 |
| 人体细胞、组织和器官移植 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 人类遗传学 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 免疫学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| 伤害和暴力预防及控制 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 国际药典和药物制剂 | 13 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 31 | 14 | 8 | 3 | 8 | 2 | 72 | 30 | 42 |
| 麻风病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |

| 世卫组织专家咨询团 | 非洲 | | 美洲 | | 东南亚 | | 欧洲 | | 东地中海 | | 西太平洋 | | 总计 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | W | N | W | N | W | N | W | N | W | N | W | N | W | % |
| 疟疾 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 药物安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神卫生 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 25 | 3 | 12 |
| 神经科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
| 护理 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 |
| 营养 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 4 | 22 |
| 口腔卫生 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 11 |
| 寄生虫病（丝虫感染） | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 19 |
| 寄生虫病（综合寄生虫学） | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 6 | 26 |
| 寄生虫病（利什曼病） | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 22 |
| 寄生虫病（血吸虫病） | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 18 | 1 | 6 |
| 寄生虫病（锥虫病） | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33 |
| 预防盲症 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 25 |
| 预防耳聋和听力缺损 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| 狂犬病 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 辐射 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 |
| 康复 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 性传播感染，包括由人类免疫缺陷病毒造成的感染 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 27 | 8 | 30 |
| 传统医学 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 25 | 2 | 8 |
| 结核病 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 5 | 28 |
| 媒介生物学和控制 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 28 | 7 | 25 |
| 病毒性疾病 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 病毒性疾病（抗病毒药和干扰素） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 人畜共患疾病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **总计** | 85 | 16 | 184 | 61 | 74 | 31 | 247 | 49 | 88 | 25 | 103 | 25 | 781 | 207 | 27 |
| | | 19% | | 33% | | 42% | | 20% | | 28% | | 24% | | | |

截至 2009 年 12 月咨询团成员数目，N 指咨询团成员总数，W 指女性成员数目，%指女性咨询团成员占其咨询团和区域成员总人数的百分比。这些数字体现了专家总人数。各有关专家团中包含拥有一个以上国籍的成员，但在总人数中对他们只计算一次。