



## Nutrition

### La nutrition chez la mère, le nourrisson et le jeune enfant : projet de plan d'application exhaustif

#### Rapport du Secrétariat

#### RECTIFICATIF

Veuillez remplacer le paragraphe 25 de l'annexe par le texte suivant :

25. **Cible mondiale 3 : Réduire de 30 % d'ici à 2025 l'insuffisance pondérale à la naissance.** Cette cible suppose de réduire de 30 % en termes relatifs, d'ici à 2025, le nombre d'enfants dont le poids de naissance est inférieur à 2500 g par rapport à une référence correspondant à la période 2006-2010. Cela représenterait une baisse annuelle de 3,9 % en termes relatifs entre 2012 et 2025. Au Bangladesh et en Inde, où naissent près de la moitié des enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance dans le monde, la prévalence observée est passée respectivement de 30,0 % à 21,6 % (entre 1998 et 2006) et de 30,4 % à 28,0 % (entre 1999 et 2005). Une réduction de la prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance a également été observée en El Salvador (de 13 % à 7 % entre 1998 et 2003), en Afrique du Sud (de 15,1 % à 9,9 % entre 1998 et 2003) et en République-Unie de Tanzanie (de 13,0 % à 9,5 % entre 1999 et 2005). Dans ces exemples, les reculs enregistrés sont de l'ordre de 1 % à 12 % par an. Les taux de réduction les plus élevés ont été observés dans les pays où une part importante de l'insuffisance pondérale à la naissance tient à des retards de croissance intra-utérine, ces derniers étant plus faciles à réduire que la prématurité.

= = =