

DIPHTHÉRIE. *(1933-34)*

Les totaux annuels provisoires indiquent une amélioration de la situation, dans la plupart des pays d'Europe occidentale et orientale et aux États-Unis. Au cours de l'hiver 1933-34, la fréquence de la diphtérie a été en augmentation sur l'hiver précédent en Grande-Bretagne, Allemagne, Finlande et Bulgarie.

Amérique : ETATS-UNIS.— Bien que le nombre de cas relevés au cours des quatre semaines finissant le 30 décembre était encore de 12% supérieur à celui relevé au cours de la période correspondante de l'année précédente, la situation dans son ensemble a été plus favorable en 1933 qu'en 1932. Au cours des quatre semaines finissant le 27 janvier 1934, 4.261 cas ont été relevés aux États-Unis, soit à peu près le même total qu'au cours de la période correspondante de 1933 (4.194), par opposition à 6.706 cas, 5.429 et 6.730 relevés au cours des quatre premières semaines des années 1930-32.

DIPHTHERIA.

Provisional annual totals show an improvement in the situation in most of Western and Eastern Europe and in the United States. During the winter of 1933-34, the prevalence of diphtheria increased as compared with the previous winter in Great Britain, Germany, Finland and Bulgaria.

America : UNITED STATES. — Although the number of cases recorded during the four weeks ended December 30th remained 12% higher than that recorded during the same period of the previous year, the general situation was better in 1933 than in 1932. During the four weeks ended January 27th, 4,261 cases were registered in the United States, which is approximately the same total as during the same period of 1933 (4,194), as compared with 6,706, 5,429 and 6,730 cases recorded during the first four weeks of the years 1930, 1931 and 1932.

CAS DE DIPHTÉRIE DÉCLARÉS DANS DIVERS PAYS, 1932 — 1934.
 CASES OF DIPHTHERIA REPORTED IN CERTAIN COUNTRIES, 1932 — 1934.

Mois Month	Danemark Denmark		Suède Sweden		Finlande Finland		Pays-Bas Netherlands		France		Tchécoslovaquie Czechoslovakia		Bulgarie Bulgaria		Roumanie Roumania		Yougoslavie Yugoslavia	
	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933
I	306	378	171	245	118	290	551	529	2.564	2.370	2.586	3.298	295	513	421	439	693	1.041
II	246	214	148	157	150	177	513	355	2.270	1.901	2.179	2.768	298	409	368	320	640	789
III	251	204	90	148	106	132	495	504	2.084	1.909	1.934	2.669	212	444	383	324	559	624
IV	158	148	146	147	68	75	358	386	1.728	1.631	1.527	2.153	199	279	198	226	461	483
V	162	118	117	77	78	127	406	373	1.700	1.913	1.546	2.163	199	257	215	239	375	496
VI	144	116	122	68	41	79	378	294	1.781	1.546	1.541	1.861	128	211	178	289	368	424
VII	155	108	165	153	71	69	348	268	1.460	1.310	1.397	1.512	116	168	165	218	368	427
VIII	177	110	141	106	85	93	255	180	1.176	1.020	1.476	1.636	180	218	216	265	525	490
IX	321	80	129	206	168	149	376	321	1.015	954	2.797	2.188	220	329	415	334	886	727
X	354	210	154	196	169	251	506	369	1.512	1.658	4.582	3.084	390	430	578	561	1.636	994
XI	395	249	240	154	222	274	576	366	2.350	2.379	5.465	3.585	608	545	728	728	1.933	1.274
XII	379	195	290	81	317	277	591	301	2.711	2.127	4.910	2.907	661	502	693	501	1.614	963
Total	3.048	2.130	1.913	1.738	1.593	1.993	5.353	4.246	22.351	20.718	31.940*	29.824	3.506*	4.355	4.558	4.444	10.158*	8.732
I	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934
	378	155	245	89	290	260	529	260†	2.370	2.241	3.298	...	513	...	439	...	1.041	842

Période de 4 sem. terminée le: Four-Week Period ended:	Angleterre England		Allemagne Germany		Belgique Belgium		Suisse Switzerland		Italie Italy		Pologne Poland		Autriche Austria		Etats-Unis United States		Hongrie Hungary	
	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933	1932	1933
28.I	3.818	3.253	5.299	7.528	248	157	236	296	2.234	3.119	1.479	1.671	1.457	2.385	6.739	4.194	1.912	2.034
25.II	3.921	3.067	4.831	5.794	202	135	175	243	1.954	2.530	1.263	1.434	1.352	1.821	5.144	3.183	1.437	1.663
25.III	3.317	3.208	3.833	5.111	200	179	174	182	1.736	2.256	998	1.354	1.084	1.487	3.978	2.891	1.148	1.586
22.IV	3.027	2.865	3.138	4.437	212	132	144	137	1.580	2.075	940	1.102	1.013	1.222	3.270	2.525	1.038	1.198
20.V	2.886	2.963	3.164	4.115	168	140	174	140	1.364	1.874	781	1.049	929	1.165	2.903	2.033	1.004	1.089
17.VI	2.878	2.905	2.918	4.037	140	131	122	120	1.246	1.720	837	863	931	1.083	2.518	1.857	746	907
15.VII	2.815	3.091	2.763	3.933	124	139	122	103	1.154	1.306	749	852	940	975	2.089	1.722	695	858
12.VIII	2.631	3.126	2.637	3.508	127	127	103	110	1.005	1.356	728	799	875	896	2.216	1.778	955	627
9.IX	2.765	3.125	3.362	4.314	77	86	117	184	1.374	1.661	1.168	1.124	1.101	1.241	2.971	2.682	1.589	811
7.X	3.538	4.540	5.740	6.138	152	199	189	196	1.936	...	2.038	1.421	1.945	1.704	5.716	4.833	2.775	1.051
4.XI	4.062	5.104	7.414	7.844	173	284	166	188	2.986	...	2.648	1.917	3.170	2.332	7.819	8.304	3.370	1.459
2.XII	4.164	5.349	9.530	9.483	219	270	252	205	3.426	...	2.809	1.969	3.383	2.437	6.781	7.450	2.860	1.799
30.XII	3.692	5.087	9.564	8.282	223	200	291	168	3.390	...	2.226	1.632	3.488	2.009	4.546	5.161	...	1.438
Total	43.357*	47.683	64.138*	74.554	2.265	2.179	2.265*	2.272	25.749*	...	18.664	17.187	21.668	20.757	56.690	48.613	19.529	16.318
27.I	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934
24.II	3.253	5.400	7.528	7.704	157	183	296	138	3.119	...	1.671	1.572	2.385	1.523	4.194	4.261	2.034	1.397
	3.067	5.447	5.794	7.152	135	147	243	112	2.530	...	1.434	1.539	1.821	...	3.183	...	1.663	1.329

* Total définitif. - Revised total. — § Données mensuelles. - Monthly data. — † Période de 4 semaines. - Four-week period.

Europe: ALLEMAGNE. — L'augmentation de la fréquence de la diphtérie observée en Allemagne ces dernières années a continué en 1933; le nombre de cas relevés en 1933 est encore en augmentation de près de 11,5% par rapport aux cas signalés en 1932. Le maximum saisonnier a été atteint au cours de la dernière semaine du mois de novembre (2.564 cas). Le taux de létalité diphtérique est en diminution progressive au cours des deux dernières années; il a été de 6,4 en 1929, de 6,2 en 1930, et de 4,6 et 4,9% respectivement au cours des années 1932 et 1933.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES. — Le maximum saisonnier a été atteint au cours de la semaine finissant le 2 décembre, avec 1.450 cas. Ce nombre a légèrement diminué en décembre, mais augmenté en janvier pour atteindre 1.414 cas entre le 28 janvier et le 3 février. Le nombre de cas signalés, au cours des quatre semaines finissant le 3 mars a été successivement de 1.386, 1.351, 1.294 et 1.234.*

ECOSSE. — Au cours des deux premières périodes de quatre semaines finissant le 24 février, le nombre de cas de diphtérie a été successivement de 1.016 et 1.183, contre 601 et 583, signalés entre le 1^{er} janvier et le 25 février de l'année précédente. Au cours de l'année 1933, 8.840 cas avec 356 décès ont été relevés en Ecosse (taux de létalité 4,0%).

TCHÉCOSLOVAQUIE. — Les cas de diphtérie signalés en 1932 et 1933 se répartissent comme suit:

	1932	1933		1932	1933
Bohême	20.239	19.581	Bohemia	20.239	19.581
Moravie et Silésie	7.705	6.632	Moravia and Silesia	7.705	6.632
Slovaquie	3.496	3.160	Slovakia	3.496	3.160
Russie subcarpathique	442	451	Sub-Carpathian Russia	442	451
Total	31.882	29.824	Total	31.882	29.824

* Chiffre provisoire. — Provisional data.

Europe: GERMANY. — The increased prevalence of diphtheria noticeable in Germany during recent years has continued in 1933; the number of cases recorded in 1933 is still higher (nearly 11.5%) than that reported in 1932. The seasonal maximum occurred during the final week of November (2,564 cases).

The mortality rate of diphtheria has fallen progressively during the past two years; it was 6,4 in 1929, 6,2 in 1930 and 4,6 and 4,9 respectively in 1932 and 1933.

ENGLAND AND WALES. — The seasonal maximum occurred during the week ended December 2nd with 1,450 cases. The number fell slightly in December but rose in January, reaching 1,414 cases between January 28th and February 3rd. The number of cases reported during the four weeks ended March 3rd was 1,386, 1,351, 1,294 and 1,234* respectively.

SCOTLAND. — During the first two four-weekly periods ended February 24th, the number of cases of diphtheria was 1,016 and 1,183 respectively, as compared with 601 and 583 reported between January 1st and February 25th during the previous year. During the year 1933, 8,840 cases and 356 deaths were recorded in Scotland (mortality rate 4,0%).

CZECHOSLOVAKIA. — Cases of diphtheria reported during 1932 and 1933 are distributed as follows: