

PALUDISME.

Asie : CEYLAN. — La situation au 15 janvier peut être résumée comme suit :

Dans toute la zone d'épidémie, la fréquence du paludisme a continué à décroître lentement depuis la troisième semaine de décembre.

Dans le bassin de la rivière Deduru Oya, où se trouve Kurunegala, le déclin a été très considérable et le nombre des malades est maintenant d'environ un tiers inférieur à ce qu'il était il y a 3 semaines. Dans la région côtière entre Mundel et Chilaw, on enregistre également beaucoup moins de cas.

Dans le bassin supérieur de la Maha Oya, le déclin a commencé à la fin de la seconde semaine de décembre et a atteint 20 % du nombre de malades.

Dans la partie moyenne du bassin de la Maha Oya, le déclin sur la rive nord a été encore plus marqué, atteignant près de 40 %. Par contre sur la rive sud, la diminution n'est que de 10 %. Dans la région côtière de la Maha Oya, ce n'est qu'à la fin de l'année que l'épidémie a atteint son point culminant et le déclin au cours de la première semaine de janvier a été faible.

Le déclin de l'épidémie dans le bassin de la rivière Kelani a été moins rapide dans sa partie haute; le maximum épidémique a été atteint à la fin de l'année. Une décroissance de 10 % seulement s'est produite au cours de la première semaine de janvier. Dans la région moyenne, autour d'Avisawella, le nombre des malades reste stationnaire. La zone côtière a été envahie plus tardivement et moins fortement que les parties moyenne et élevée du bassin de cette rivière; aussi le maximum épidémique n'y a-t-il été atteint qu'à la fin de la première semaine de janvier.

Dans la Province Centrale, la zone épidémique comprend le district de Matale au nord et s'étend au sud le long de la rivière Mahaweli Ganga, de Kotmale et Nawalapitiya à Teldeniya. La partie méridionale de cette région a moins souffert que celle du nord. Le plus grand nombre de cas y a été enregistré au cours de la troisième semaine de décembre. Une diminution considérable s'est produite dans le district de Matale, et une diminution moindre ailleurs.

Le bassin de la Kalu Ganga n'a pas été aussi sévèrement touché que ceux de la Maha Oya et de la Kelani Ganga. Dans le district de Ratnapura, le déclin a été continu depuis la troisième semaine de décembre. Dans la zone moyenne, l'épidémie n'a pas été grave; le nombre des cas reste à peu près stationnaire. Dans la zone côtière, le nombre des cas a été relativement faible, sauf à Panadura.

A l'hôpital général de Colombo, depuis le milieu de décembre, le nombre quotidien de consultants externes atteints de paludisme a été en moyenne de 45; le nombre quotidien d'entrées pour cette maladie a été de 47.

Dans l'ensemble de la zone affectée, le nombre des centres de traitement: hôpitaux, dispensaires, etc., est d'environ 900. Sur une grande partie du territoire, ces centres sont éloignés les uns des autres de moins de 5 kilomètres.

La plupart des malades en traitement actuellement sont des sujets infectés il y a plusieurs se-

MALARIA.

Asie : CEYLON. — The situation on January 15th may be summarised as follows:

The amount of malaria throughout the epidemic area has continued to decrease slowly since the third week of December.

In the Deduru Oya basin, in which Kurunegala is situated, the decrease has been very considerable and the number of patients is now nearly a third less than it was three weeks ago. In the coastal area between Mundel and Chilaw, considerably fewer cases are also being recorded.

In the upper part of the Maha Oya basin, the decrease started at the end of the second week of December and has amounted to about 20 per cent of the number of patients.

In the middle area of the Maha Oya basin, the decrease on the northern bank has been even greater, amounting to nearly 40 per cent, but to the south of the river the decrease is only about 10 per cent. In the Maha Oya coastal area, the peak of the outbreak was not reached until the end of the year and during the first week of January a slight decrease only took place.

The decline of the epidemic in the Kelani Ganga basin has been less rapid along the upper part of the river. The height of the epidemic was reached at the end of the year and the decline during the first week of January was only about 10 per cent, while in the middle area, the number of patients under treatment remains stationary. The coastal area was invaded later and less severely than the upper and middle parts of the river, and the height of the epidemic here was not reached until towards the end of the first week of January.


In the Central Province, the area of the epidemic covers the Matale district in the north and extends along the Mahaweli Ganga from Kotmale and Nawalapitiya in the south, to Teldeniya. The southern part of this area has not been so badly affected as the northern and the greatest number of cases was registered during the third week in December. There has been a considerable decrease in the Matale district and a slighter decrease elsewhere.

The basin of the Kalu Ganga has not been as badly affected as those of the Maha Oya and the Kelani Ganga. In the Ratnapura district there has been a steady decline in cases since the third week in December. In the middle area, the epidemic has not been severe and the number of cases remains fairly stationary. In the coastal area, the number of cases has been comparatively small, except at Panadura.

At the General Hospital, Colombo, since the middle of December the daily number of new malaria cases attending the Out-patients Department has averaged 45, and the daily average number of admission of cases of malaria to the wards has been 47.

Some 900 treatment centres, including hospitals and dispensaries, are at work in the affected area. Over a large part of the area, the treatment centres are less than three miles apart.

The great majority of patients now under treatment were infected some weeks ago and are now



maines et souffrant de rechutes et de la débilité qu'entraîne le paludisme chez les sujets sous-alimentés.

Au cours de la dernière semaine de janvier, il en était encore de même et le nombre des cas nouveaux était minime par rapport avec le mois précédent.

suffering from relapses and the severe debility which in under-nourished persons so frequently follows malaria.

Such was still the case during the last week of January. The number of fresh cases was quite small as compared with the previous month.