

قبل البدء بتخدير المريض

(بواسطة ممرض واحد وأخصائي تخدير واحد على الأقل)

هل أكد المريض هويته و الإجراء الجراحي و موضع هذا الإجراء و موافقته عليه؟

نعم

هل وُضعت علامة على موضع الإجراء الجراحي؟

نعم

لا ينطبق

هل تم التحقق من جهاز التخدير وأدوية التخدير؟

نعم

هل تم توصيل جهاز قياس التأكسج النبضي بجسم المريض والتحقق من أنه يعمل؟

نعم

هل يعاني المريض مما يلي:

حساسية معروفة

لا

نعم

صعوبة في الطرق التنفسية أو خطر حدوث الأستنشاق؟

لا

نعم، والمعدات المساعدة متاحة

خطر فقدان الدم بكمية أكبر من 500 ميليلتر (7 ميليلتر / كغم لدى الأطفال)؟

لا

نعم، وتم التخطيط لاستعمال قنطرتين وريديتين / مركزتين ولإعطاء السوائل اللازمة

قبل إجراء البضع الجراحي الجراحي

(بواسطة ممرض وأخصائي تخدير وجراح)

تأكيد أن جميع أعضاء الفريق قد قدموا أنفسهم وذكروا أسماءهم وأدوارهم.

تأكيد اسم المريض والإجراء الجراحي وموضع البضع الجراحي.

هل أعطي المريض المضاد الحيوي الوقائي خلال الستين دقيقة السابقة؟

نعم

لا ينطبق

استباق الأحداث الحرجة

أُسئلة تُطرح على الجراح:

ما الخطوات الحرجة أو غير الروتينية؟

ما المدة التي ستستغرقها الحالة؟

ما كمية الدم المتوقع فقدانها؟

سؤال يُطرح على أخصائي التخدير:

هل هناك أية محاذير محددة بخصوص المريض؟

أُسئلة تُطرح على فريق التمريض:

هل تم التأكد من التعقيم (مما في ذلك نتائج مؤشر جهاز التعقيم)؟

هل هناك مشاكل في المعدات أو أية محاذير أخرى؟

هل صور الأشعة الضرورية معروضة؟

نعم

لا ينطبق

قبل مغادرة المريض غرفة العمليات

(بواسطة ممرض وأخصائي تخدير وجراح)

يؤكد الممرض ما يلي شفهيًا:

اسم الإجراء الجراحي

إكمال عدد الأدوات والشاش الجراحي والأبر

توسيم العينات (يجب قراءة محتوى بطاقة توسيم العينات بصوت مسموع، بما في ذلك اسم المريض)

وجود أو عدم وجود أية مشاكل في المعدات يتعين حلها

سؤال يُطرح على الجراح وأخصائي التخدير والممرض:

ما هي الاعتبارات الأساسية المتعلقة بإفافة المريض والتدبير العلاجي لحالته؟