

الإعلان السياسي المنبثق عن الاجتماع الرفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية (غير السارية) ومكافحتها

تقرير من المدير العام

تصويب

الملحق ٢

مسودة توصيات بشأن تعزيز الاستجابة للسكري ورصدها في إطار البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، بما يشمل الغايات المحتملة

يرجى الاستعاضة عن السطرين الثاني والثالث من الفقرة ١ (أ) من الملحق ٢ بما يلي:

وفي عام ٢٠١٩، كان هناك أكثر من ٤٦٠ مليون شخص متعايش مع داء السكري في العالم.

الملحق ٣

مسودة الاستراتيجية العالمية بشأن صحة الفم

يرجى الاستعاضة عن السطر الأول من الفقرة ٤ من الملحق ٣ بما يلي:

أشارت التقديرات إلى أن هناك ما يزيد على ٣,٥ مليارات حالة من أمراض الفم وغيرها من الاعتلالات التي تصيب الفم في العالم في عام ٢٠١٧، ومعظم هذه الحالات يمكن الوقاية منها.

ويرجى الاستعاضة عن السطر الخامس من الفقرة ٥ من الملحق ٣ بما يلي:

ويبلغ معدل الانتشار العالمي لحالات شقوق الفم والوجه، وهي أكثر العيوب الخلقية القحفية الوجهية شيوعاً، حوالي حالة واحدة كل ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ مولود ويختلف اختلافاً شديداً حسب الدراسات والسكان. ٤,٣ وتشير التقديرات إلى أن معدل الانتشار العالمي للإصابات السنّية الرضحية يبلغ ٢٣٪ بالنسبة للأسنان اللبنية و ١٥٪ للأسنان الدائمة، وأنها تصيب أكثر من مليار شخص. ٥

الملحق ٥

**التقدّم المُحرز في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتسريع وتيرة القضاء
على سرطان عنق الرحم بوصفه مشكلة من مشاكل الصحة العامة،
وما يرتبط بها من أهداف وغايات للفترة ٢٠٢٠-٢٠٣٠**

يرجى الاستعاضة عن السطر الثاني من الفقرة ٧ من الملحق ٥ بما يلي:

التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. لقد أُحرز تقدّم في إدراج لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في جداول التحصين الوطنية ليصل عدد البلدان التي أدرجته إلى ١١٧ بلداً في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، ومن المتوقع أن يصل عدد البلدان إلى ١٢٠ بلداً في نهاية عام ٢٠٢٢، وهناك ٤٠ بلداً تُقدّم التطعيم للفتيان كذلك.

الملحق ٦

التقدم المحرز في الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتعزيز الصحة النفسية

يرجى الاستعاضة عن الحاشيتين ١ و ٣، في الصفحة ٥٨، في الملحق ٦ بما يلي:

١ الإحصاءات الصحية العالمية ٢٠٢١. ملخص مرئي. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢١.
<https://www.who.int/data/stories/world-health-statistics-2021-a-visual-summary>

يرجى الاستعاضة عن الحاشية ٢، في الصفحة ٥٧، في الملحق ٦ بما يلي:

٢ أهم عشرة أسباب للوفاة. صحيفة وقائع. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٠.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>

يرجى الاستعاضة عن السطر الأخير من الفقرة ٧ من الملحق ٦ بما يلي:

وقد أظهر مرض السكري اتجاهاً سلبياً، حيث شهد زيادة بنسبة ٣٪ خلال تلك الفترة.^٣

ويرجى الاستعاضة عن نص وجدولي الفقرة ٨ من الملحق ٦ بما يلي:

وهناك تراجع في أعداد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين ٣٠ و ٧٠ عاماً (الوفيات "المبكرة")، وهي الفئة العمرية الأكثر إنتاجية من الناحية الاقتصادية. كما تراجعت المعدلات العالمية للوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية، مقيسةً باحتمال الوفاة بسبب أحد الأمراض غير السارية الأربعة الرئيسية بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين ٣٠ و ٧٠ عاماً (المؤشر ٣-٤-١ لأهداف التنمية المستدامة) بأكثر من الخمس من ٢٢.٩٪ في عام ٢٠٠٠ إلى ١٧.٨٪ في عام ٢٠١٩. ع غير أنه على الرغم من اتجاهات التراجع الإجمالية في الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية الأربعة الرئيسية، فإن مجموع الوفيات المنسوبة عموماً إلى هذه الأسباب سجل ارتفاعاً بسبب النمو السكاني وشيخوخة السكان، على النحو المبين في الجدول أدناه.

العمر عند الوفاة بسبب الأمراض غير السارية	٢٠٠٠	٢٠١٠	٢٠١٥	٢٠١٩
فوق ٧٠ سنة	١٦,٨	١٩,٩	٢١,٨	٢٣,٨
٣٠-٧٠ سنة من العمر*	١٢,٧	١٣,٧	١٤,٧	١٥,٧
أقل من ٣٠ سنة	١,٧	١,٥	١,٤	١,٤
مجموع الوفيات (بالملايين)	٣١,٢	٣٥,١	٣٧,٩	٤٠,٩

٢٠١٩	٢٠١٥	٢٠١٠	٢٠٠٠	الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية في الفئة العمرية ٣٠-٧٠ سنة من العمر*
٦,٢	٥,٩	٥,٦	٥,٣	الأمراض القلبية الوعائية
٤,٩	٤,٥	٤,٢	٣,٧	السرطان
٠,٧	٠,٦	٠,٥	٠,٤	داء السكري
١,١	١,١	١,١	١,١	الأمراض التنفسية المزمنة
٠,٦	٠,٥	٠,٤	٠,٤	الاضطرابات النفسية
٢,٢	٢,١	٢,٠	١,٨	الفئات الأخرى
١٥,٧	١٤,٧	١٣,٧	١٢,٧	المجموع (بالملايين)

ويرجى الاستعاضة عن الحاشيتين ١ و ٣ في الصفحة ٥٨، في الملحق ٦ بما يلي:

١ الإحصاءات الصحية العالمية لعام ٢٠٢١. ملخص مرئي. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢١.
<https://www.who.int/data/stories/world-health-statistics-2021-a-visual-summary>

ويرجى الاستعاضة عن الحاشية ٢، في الصفحة ٥٨، في الملحق ٦ بما يلي:

٢ إحصاءات الصحة العالمية لعام ٢٠٢١: رصد الصحة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بالإنكليزية). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢١. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342703/9789240027053-eng.pdf>

ويرجى الاستعاضة عن نص وجدول الفقرة ١١ من الملحق ٦ بما يلي:

ويُعد قياس احتمال الوفاة الناجمة عن أي مرض من الأمراض القلبية الوعائية أو السرطان أو السكري أو الأمراض التنفسية المزمنة في أوساط من تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٧٠ عاماً (المؤشر ٣-٤-١ استناداً إلى البيانات المرجعية لعام ٢٠١٥) أمراً هاماً لتقييم مدى العبء الناجم عن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية بين السكان. وقد انخفض احتمال الوفيات المبكرة في العالم بأكثر من الخمس، من ٢٢,٩٪ في عام ٢٠٠٠ إلى ١٧,٨٪ في عام ٢٠١٩. ٣

احتمال الوفاة الناجمة عن أي مرض من الأمراض القلبية الوعائية أو السرطان أو السكري أو الأمراض التنفسية المزمنة في أوساط من تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و ٧٠ عاماً

٢٠١٩	٢٠١٥	٢٠١٠	٢٠٠٠	فئة الدخل حسب تصنيف البنك الدولي
٢٣,٩	٢٤,٥	٢٥,٧	٢٨,٣	البلدان المنخفضة الدخل
٢٢,٤	٢٣,١	٢٤,٢	٢٥,٨	بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط
١٧,٤	١٨,٢	٢٠,٢	٢٤,٣	الشريحة العليا من الدخل المتوسط
١١,٣	١٢,٤	١٣,٢	١٦,٤	البلدان المرتفعة الدخل
١٧,٨	١٨,٥	١٩,٩	٢٢,٩	على الصعيد العالمي (بالنسبة المئوية)

ويرجى الاستعاضة عن الحاشية ٣، في الصفحة ٥٩، في الملحق ٦ بما يلي:

٣ الإحصاءات الصحية العالمية لعام ٢٠٢١. ملخص مرئي. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢١.
<https://www.who.int/data/stories/world-health-statistics-2021-a-visual-summary>

ويرجى الاستعاضة عن الحاشية ٢، في الصفحة ٥٩، في الملحق ٦ بما يلي:

٢ الإحصاءات الصحية العالمية لعام ٢٠٢٠. ملخص مرئي. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٠.
<https://www.who.int/data/gho/whs-2020-visual-summary>

ويرجى الاستعاضة عن السطر الثاني من الفقرة ٣١ من الملحق ٦ بما يلي:

وتشير تقديرات الصحة العالمية المحدثة للمنظمة إلى حدوث ٢٢٠ ٧٠٣ حالة انتحار في العالم في عام ٢٠١٩، وهو معدل بلغ حسب العمر ٩ حالات انتحار لكل ١٠٠ ٠٠٠ حالة (١٢,٦ من الذكور و٥,٤ من الإناث).

الملحق ٩

مسودة توصيات بشأن الوقاية من السمنة وإدارتها طوال دورة الحياة، بما يشمل الغايات المحتملة

يرجى الاستعاضة عن النقطة الفرعية الثانية من الفقرة ٤ من الملحق ٩ وإدراج الحاشية الجديدة ٤ على النحو التالي:

بلغت نسبة انتشار السمنة فيما بين الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين ٥ سنوات و ١٩ سنة في عام ٢٠١٦ حوالي ٢٠٪ أو أكثر في العديد من بلدان المحيط الهادئ وشرق المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي والأمريكتين. ٣ وطُرات على الصعيد العالمي زيادة قدرها ثلاثة أمثال في عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٦. ٤

٤ مرصد الصحة العالمي. منظمة الصحة العالمية (https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-children-and-adolescents-bmi-2-standard-deviations-above-the-median-(crude-estimate)-)، تم الاطلاع في ١١ نيسان/ أبريل ٢٠٢٢).

= = =