

مداخلة مصر فيما يخص "خارطة الطريق العالمية لدرء التهاب السحايا"

إن خارطة الطريق للقضاء على التهاب السحايا بحلول عام ٢٠٣٠ تعد استراتيجية عالمية رائدة إضافة إلى كونها عنصراً أساسياً في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وقد أحرزت مصر تقدماً كبيراً في تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية بما يتماشى مع خارطة الطريق العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

فعلى الصعيد الوطني في جمهورية مصر العربية لم تحدث أى تفشيات وبائية لمرض الإلتهاب السحائي الوبائي منذ عام ١٩٨٩ ونجحت وزارة الصحة في خفض معدلات الإصابة إلى ٠,٢ لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمة علماً بأن العتبة الوبائية لمرض الالتهاب السحائي الوبائي هي ٥ حالات لكل ١٠٠,٠٠٠ نسمة.

تسعى مصر إلى الوقاية من الأوبئة ومكافحتها من خلال تحقيق نسبة تغطية عالية من التطعيم ضد المرض، وعليه فقد نجحت وزارة الصحة في الحفاظ على نسبة عالية من التغطية باللقاحات المضادة للنيسريا السحائية، والمكورات الرئوية، والمستدمية النزلية من النمط ب، حيث قامت وزارة الصحة:

- بإدراج التطعيم ضد ميكروب الانفلونزا المستدمية البكتيرية (هيموفيلس انفلونزا نمط ب) وهي إحدى مسببات مرض الالتهاب السحائي وخاصة عند الأطفال أقل من خمس سنوات ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات الروتينية بمصر للأطفال في سن (٢ - ٤ - ٦) شهور منذ شهر فبراير ٢٠١٤.

- توفير أكثر من ٦,٨ مليون جرعة سنوياً من طعم الإلتهاب السحائي عديد السكريات الثنائي (A,C) لتطعيم تلاميذ المدارس في الصف الأول من كل مرحلة تعليمية.

- فى عام ٢٠٠٧ تم تعديل سياسة التطعيم فى مصر حيث يتم توفير ما يقرب من ٦٠٠,٠٠٠ جرعة سنوياً من الطعم السحائي الرباعي المقترن ACYW135 للتجمعات مثل الحجاج والمعتمرين، معسكرات الجيش، الشرطة، مراكز الإصلاح والتأهيل، المسافرين إلى الأماكن الموبوءة.

ولضمان الاكتشاف المبكر واستجابة أكثر فاعلية لأوبئة الالتهاب السحائي، يتم ترصد أمراض التهاب الجهاز العصبي الحاد المعدية من خلال نظام الترصد القومي الروتيني بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ونظام ترصد المواقع المختارة في مواقع موزعة جغرافياً وممثلة لجميع مناطق مصر، وتستخدم الوقاية الكيميائية بالمضادات الحيوية للمخالطين لحالات الإلتهاب السحائي الوبائي بالنيسريا لمنع انتشار المرض.

كما يتم دعم الأشخاص المصابين بالتهاب السحائي ورعايتهم من خلال رفع الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية والمواطنين من أجل التشخيص والعلاج المبكر ومن ثم تحسين الآثار اللاحقة وتوفير الدعم بما في ذلك إعادة التأهيل.

وأخيراً أود التأكيد على التزامنا الكامل بخطة العمل الدولية وضرورة تضافر كافة الجهود من جانب الدول الأعضاء والشركاء والمانحين في سبيل عالم خالي من التهاب السحايا.

Egypt's Intervention on

“Global roadmap on defeating meningitis by 2030”

The roadmap on defeating meningitis by 2030 is a pioneering global strategy and is considered an essential component of achieving universal health coverage.

Egypt has made significant progress in implementing the activities of the National Action Plan in line with the global roadmap and with the recommendations of the WHO.

At the national level in Egypt, there have been no outbreaks of epidemic meningitis since 1989, and the Ministry of Health succeeded in reducing the incidence rate to 0.02 per 100,000 people, noting that the epidemiological threshold for epidemic meningitis is 5 cases per 100,000 people.

Egypt seeks to prevent and control epidemics by achieving a high coverage rate of vaccination against the disease, and accordingly the Ministry of Health has succeeded in maintaining a high rate of coverage with vaccines against *Neisseria meningitidis*, pneumococcus, and *Haemophilus influenzae* type b, as the Ministry of Health has:

- Inserted the vaccination against the bacterial *Haemophilus influenzae* type b, which is one of the causes of meningitis, especially in children under five years, within the national program for routine immunizations in Egypt for children at the age of (2, 4, 6) months since February 2014.
- Provided more than 6.8 million doses annually of the meningococcal polysaccharide vaccine (groups A and C) to vaccinate schoolchildren at the first grade of each educational stage.

- In 2007, the vaccination policy was amended in Egypt, where approximately 600,000 doses are provided annually of the Meningococcal Quadrivalent Conjugate Vaccines (Groups A,C,Y,W-135) for gatherings such as pilgrims, military camps, police, Correctional Rehabilitation Center, and travelers to endemic areas.

In order to ensure early detection and a more effective response to meningitis outbreaks, the acute infectious nervous diseases are monitored through the routine national surveillance system in all health facilities nationwide, and the sentinel surveillance system in selected geographically distributed hospitals representing all regions of Egypt. Chemical prophylaxis with antibiotics is used for contacts of cases with epidemic *Neisseria meningitis* to prevent the spread of the disease.

We also support and care for patients with meningitis by raising awareness among health care providers and the public for early diagnosis and treatment, thus improving subsequent effects and providing support, including rehabilitation.

Finally, I would like to express our full commitment to the Global Action Plan and the necessity of joint efforts by Member States, partners and donors towards a world free of meningitis.