

RESULTS OF SCREENING FOR GONORRHEA
RÉSULTATS DU DÉPISTAGE DE LA BLENNORRAGIE

UNITED STATES OF AMERICA. — In the 12-month period ending 30 June, 8 016 879 specimens were taken from women as a part of gonorrhea screening programmes; 345 090 (4.3%) were cultured and found to be positive. *Table 1* reflects the results of such screening

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Au cours de la période de 12 mois terminée le 30 juin 1974, 8 016 879 échantillons ont été prélevés sur des femmes dans le cadre de divers programmes de dépistage de la blennorragie; 345 090 de ces échantillons (4,3%) ont été mis

Results of Gonorrhea Culture Tests on Females
United States,* July 1973-June 1974**
Résultats du dépistage de la blennorragie chez les femmes
Etats-Unis,* juillet 1973-juin 1974**

Source of Test Origine de l'épreuve	Number Tested Nombre d'épreuves	Number Positive Nombre de résultats positifs	Percent Positive Pourcentage de résultats positifs	Source of Test Origine de l'épreuve	Number Tested Nombre d'épreuves	Number Positive Nombre de résultats positifs	Percent Positive Pourcentage de résultats positifs
Health Care Providers (Excluding VD Clinics) Tous dispensateurs de soins médicaux (sauf dispensaires antivénériens)				Private Physicians Cabinets privés	2 286 743	44 540	1.9
Health Dept. Non-VD Clinic	7 233 041	196 114	2.7	Private Family Planning Groups			
Dispensaires publics autres qu'antivénériens	1 474 248	48 105	3.3	Groupements privés s'occupant de planification familiale	795 738	16 061	2.0
Family Planning				Group Health Clinics			
Planification familiale	994 102	31 923	3.2	Dispensaires de groupe	105 587	3 083	2.9
Prenatal, Ob-Gyn				Student Health Centers			
Soins prénatals, obstétrique-gynécologie	159 127	5 452	3.4	Centres de santé universitaires	230 624	3 550	1.5
Cancer Detection				Manpower Training Agencies			
Dépistage du cancer	35 351	399	1.1	Organismes de formation professionnelle	11 441	690	6.0
Combinations or Other				Industrial Screening			
Mixtes et autres	285 668	10 331	3.6	Dépistage industriel	17 687	318	1.8
Public/Private Hospital Hôpitaux publics/privés				Military/Dependents			
—Outpatient				Etablissements médicaux des armées/Familles des militaires	150 251	2 103	1.4
—Soins ambulatoires	1 347 847	52 675	3.9	Correction or Detention Centers			
Family Planning				Centres de correction ou de détention	46 512	2 378	5.1
Planification familiale	185 914	6 128	3.3	Not Specified			
Prenatal, Ob-Gyn				Non précisé	114 852	3 461	3.0
Soins prénatals, obstétrique-gynécologie	352 120	12 600	3.6	Venereal Disease Clinics			
Cancer Detection				Dispensaires antivénériens	783 838	148 976	19.0
Dépistage du cancer	14 429	226	1.6	Gonorrhea Contacts			
Combinations or Other				Contacts de sujets atteints de blennorragie	93 519	35 240	37.7
Mixtes et autres	795 384	33 721	4.2	Syphilis: Contact/Cluster/Reactor			
Public/Private Hospital Hôpitaux publics/privés				Syphilis: contacts/« grappes »/séroreacteurs	12 120	1 365	11.3
—Inpatient				Other — Autres	678 199	112 371	16.6
—Hospitalisation	60 059	1 658	2.8				
Obstetric							
Obstétrique	10 288	318	3.1				
Gynecological							
Gynécologique	2 083	61	2.9				
Combinations or Other							
Services et autres	47 688	1 279	2.7				
Community Health Centers Centres de santé	591 452	17 492	3.0				
Family Planning							
Planification familiale	252 368	4 723	1.9				
Prenatal, Ob-Gyn							
Soins prénatals, obstétrique-gynécologie	44 378	962	2.2				
Cancer Detection							
Dépistage du cancer	1 573	21	1.3				
Combinations or Other							
Mixtes et autres	293 133	11 786	4.0	Total (All Clinics) Total (Tous services)	8 016 879	345 090	4.3

* Includes reports from Puerto Rico and Trust Territories — Y compris les données en provenance de Porto Rico et des Territoires sous tutelle.
** Excludes reports from Guam (July 1978-June 1974) and Alaska (April 1974-June 1974) — Non compris les données en provenance de Guam (juillet 1973-juin 1974) et de l'Alaska (avril 1974-juin 1974).

RESULTS OF SCREENING FOR GONORRHEA

(continued)

by the types of health care facilities securing the specimen. Although the positivity rates were highest (19.0%) in venereal disease clinics, some 90% of all tests were performed in other settings. In these settings, culture positivity rates in women ranged from 1.4% among dependents examined at military installations to 6.0% among enrôlées in manpower programmes. Among 2 286 743 women tested by private physicians, cultures from 44 540 (1.9%) were positive.

Provisional data indicate that an additional 1 425 967 women were tested at all types of facilities in July and August 1974, or about 700 000 per month. For this period, the overall positivity rate of cultures from all sources was 4.3%.

RÉSULTATS DU DÉPISTAGE DE LA BLENNORRAGIE

(suite)

en culture et se sont révélés positifs. On trouvera au *Tableau 1* les résultats des épreuves selon les services ayant prélevé les échantillons. Les taux de positivité les plus élevés (19,0%) ont été enregistrés dans les dispensaires antivénéériens, mais environ 90% de toutes les épreuves ont été pratiquées dans d'autres services où les taux de positivité ont varié de 1,4% parmi les femmes parentes de militaires vues dans des services médicaux des armées à 6,0% parmi les femmes participant à des programmes sociaux de formation professionnelle. Sur 2 286 743 épreuves pratiquées par des médecins exerçant en clientèle privée, 44 540 cultures (1,9%) étaient positives.

Il ressort de données provisoires que 1 425 967 autres épreuves ont été pratiquées sur des échantillons prélevés dans les différents services en juillet et août 1974, soit environ 700 000 par mois. Pour cette période, le taux global de positivité des cultures de toutes origines a été de 4,3%.