

## TYPHUS EXANTHÉMATIQUE.

**Afrique :** ALGÉRIE. — Douze cas de typhus exanthématique ont été signalés dans le département d'Alger et 11 dans celui de Constantine au cours de la semaine finissant le 14 mai.

EGYPTE. — Le retour saisonnier du typhus exanthématique a été marqué au cours du premier trimestre de l'année par une épidémie dans la Basse-Egypte, dont les provinces les plus atteintes étaient celle de Beheira avec 563 cas et celle de Gharbieh avec 516 cas. Dans l'ensemble du pays, 1.109 cas ont été enregistrés pendant ce trimestre, contre 292 cas pendant l'année 1931 tout entière. Le maximum saisonnier a été atteint au cours de la dernière semaine de mars, et 626 cas (chiffre provisoire) ont été enregistrés pendant les quatre semaines finissant le 26 mars, ce qui constitue le plus fort total pour quatre semaines observé depuis 1923. Au cours de la première semaine de mai, 7 cas ont été signalés dans la province de Menoufieh, 5 cas celle de Gharbieh, 4 dans la province de Beheira, 8 dans la province de Keneh et 3 dans les districts frontières.



## TYPHUS.

**Africa :** ALGERIA. — Twelve typhus cases were notified in the Department of Algiers and 11 in that of Constantine during the week ended May 14th.

EGYPT. — The seasonal return of typhus was marked during the first quarter of the year by an outbreak in Lower Egypt; the provinces most affected were Beheira, with 563 cases, and Gharbiya, with 516 cases. In the whole country, 1,109 cases were recorded during this quarter, as compared with 292 cases during the whole of 1931. The seasonal maximum was reached during the last week in March and 626 cases (provisional figure) were recorded during the four weeks ended March 26th, this being the highest total observed for a period of four weeks since 1923. During the first week in May, 7 cases were notified in Minufiya Province, 5 in Gharbiya Province, 4 in Beheira, 8 in Qena and 3 in the frontier districts.

CAS DE TYPHUS EXANTHÉMATIQUE DÉCLARÉS EN EGYPTE DU 1<sup>er</sup> JANVIER 1928 AU 23 AVRIL 1932  
(PAR PÉRIODES DE QUATRE SEMAINES).

TYPHUS CASES REPORTED IN EGYPT FROM JANUARY 1st, 1928, TO APRIL 23rd, 1932  
(BY FOUR-WEEK PERIODS).



MAROC. — Entre le 8 et le 14 mai, 3 cas de typhus exanthématique ont été enregistrés dans la région de la Chaouïa, 2 dans celle du Gharb, 1 à Rabat et 1 dans la région des Doukkala.

TUNISIE. — Quinze cas de typhus exanthématique ont été signalés entre le 9 et le 15 mai, dont 9 dans le contrôle civil de Tozeur et 6 dans celui de Gafsa. Au cours de la semaine suivante, 6 cas ont été déclarés dans le contrôle civil de Tozeur et 13 dans celui du Kef, où les derniers cas signalés précédemment se sont produits en novembre 1931.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD. — Au cours de la première quinzaine de mai, 3 districts situés à l'intérieur étaient considérés comme infectés de typhus exanthématique.

Asie : PERSE. — Soixante et un cas de typhus exanthématique avec 2 décès ont été signalés entre le 3 et le 9 avril, ainsi que 58 cas avec 4 décès au cours de la semaine suivante. La localité la plus atteinte est celle de Kerman (47 cas).

Europe : LITHUANIE. — Pendant la semaine terminée le 15 mai, 4 cas de typhus exanthématique ont été déclarés dans le district de Siauliai, 2 dans celui de Trakai, 1 dans le district d'Utena et 1 cas à Kovno.

Pologne. — Le nombre des cas de typhus exanthématique signalés en Pologne entre le 8 et le 14 mai a été de 106 avec 4 décès (contre 70 avec 7 décès au cours de la semaine précédente). Quarante et un cas avec 1 décès ont été déclarés dans le département de Lwow, 17 cas en Polesie, 14 cas avec 3 décès dans le département de Stanislawow et 13 cas dans celui de Novogrodek.

MOROCOCO. — Between May 8th and 14th, 3 typhus cases were recorded in the Chaouïa district, 2 in the district of the Gharb, 1 at Rabat and 1 in the district of the Dukkala.

TUNIS. — Fifteen typhus cases were notified between May 9th and 15th, of which 9 occurred in the Tozeur Civil District and 6 in the Gafsa Civil District. During the following week, 6 cases were reported in Tozeur Civil District and 13 in Kef Civil District, where the last case previously notified had occurred in November 1931.

UNION OF SOUTH AFRICA. — During the first fortnight in May, 3 inland districts were considered infected by typhus.

Asia : PERSIA. — Sixty-one typhus cases with 2 deaths were notified between April 3rd and 9th, as well as 58 cases with 4 deaths during the following week. The locality most affected is that of Kerman (47 cases).

Europe : LITHUANIA. — During the week ended May 15th, 4 typhus cases were reported in the district of Siauliai, 2 in that of Trakai, 1 in Utena district and 1 case at Kovno.

Poland. — The number of typhus cases notified in Poland between May 8th and 14th amounted to 106 with 4 deaths (as against 70 with 7 deaths during the previous week). Forty-one cases with 1 death were reported in Lwow Department, 17 cases in Polesia, 14 cases with 3 deaths in Stanislawow Department and 13 cases in the Department of Novogrodek.

ROUMANIE. — Le nombre des cas de typhus exanthématique déclarés au cours de la première semaine d'avril a passé de 56 avec 6 décès à 53 avec 5 décès.

YUGOSLAVIE. — Un cas de typhus exanthématique a été enregistré dans le banovinat du Littoral au cours de la première semaine de mai.

ROUMANIA. — The number of typhus cases reported during the first week in April has decreased from 56 with 6 deaths to 53 with 5 deaths.

YUGOSLAVIA. — One typhus case was recorded in the Coastal banovine during the first week in May.