

# Déparasitage d'enfants d'âge scolaire



Instructions pour les maîtres  
et maîtresses d'école

Déparasitage d'enfants d'âge scolaire. Instructions pour les maîtres et maîtresses d'école.  
Conception et illustrations réalisées par Katti-ka-Batembo  
Texte d'Antonio Montresor OMS/CPE/PVC

© **Organisation mondiale de la Santé 2003**

Tous droits réservés.

Ce document n'est pas une publication officielle de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et tous les droits y afférents sont réservés par l'Organisation. S'il peut être commenté, résumé ou traduit, partiellement ou en totalité, il ne saurait cependant l'être pour la vente ou à des fins commerciales.

Les opinions exprimées dans les documents par des auteurs cités nommément n'engagent que lesdits auteurs.

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent, tableaux et cartes compris, n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

La mention de firmes et de produits commerciaux n'implique pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

Sauf exceptions indiquées, les cartes, graphiques et photographies ont été produits par des membres du personnel de l'OMS.

# Distribution des médicaments








# Introduction

La plupart des enfants des pays en voie de développement sont infectés avec des vers intestinaux ou des schistosomes.

La distribution de médicaments montrée dans ce livret a pour but de réduire le nombre de parasites dont les enfants sont porteurs.

Un enfant qui reçoit un traitement régulier contre les vers

- **Est plus actif à l'école**
- **Grandit et apprend mieux**
- **Est plus résistant aux autres infections**



# Matériels nécessaires

---

## **Pour donner les médicaments aux enfants il vous faudra**

- *Des comprimés*
- *De l'eau potable*
- *Des formulaires pour inscrire les enfants traités*
- *Une balance ou la « toise pour le praziquantel », si vous distribuez du praziquantel*



Les médicaments suivants peuvent être utilisés pour le déparasitage :

- **albendazole 400 mg** (prise unique)\* pour traiter les vers qui sont transmis par le sol
- **praziquantel 40 mg/kg** pour traiter les schistosomes qui sont transmis par de l'eau contaminée

Ces médicaments sont très efficaces et ne présentent aucun danger. Plusieurs millions d'enfants ont déjà été traités sans problèmes.

Les enseignants des écoles peuvent distribuer ces médicaments facilement et en toute sécurité.




\* alternativement  
mebendazole 500 mg (prise unique)  
levamisole 80 mg (prise unique pour les enfants d'âge scolaire)  
pyrantel 10 mg/kg  
peuvent aussi être administrés.






# **Les étapes pour la distribution des médicaments**



# Premièrement



**Demander à tous les enfants  
de se mettre en file.**



# Deuxièmement



**Enregistrer le nom de chaque enfant traité  
sur le formulaire mis à disposition.**



# Poids



# Hauteur



ou


# Troisièmement



**Si le praziquantel est distribué,  
une balance ou la « toise » est nécessaire  
pour déterminer combien de comprimés  
chaque enfant doit prendre.**

**Voir le tableau de la page 20**





# Quatrièmement



**Donner un comprimé d'albendazole  
à chaque enfant.**



# Cinquièmement



**Faire boire de l'eau à chaque enfant et vérifier qu'il a bien avalé le(s) comprimé(s).**




# Traitement des enfants non-inscrits à l'école



**Le maître (la maîtresse) d'école  
peut aussi traiter les enfants  
qui ne sont pas inscrits à l'école.**



**La « toise pour la distribution du praziquantel » détermine combien de comprimés chaque enfant doit prendre.**



**Tableau pour l'administration de praziquantel selon le poids**

<b>Poids en kg</b>	<b>Comprimés</b>
15 – 22.5	1 1/2
22.5 – 30	2
30 – 37.5	2 1/2
37.5 – 45	3
45 – 60	4





